

CHAPITRE 3 COMBINATOIRE ET DENOMBREMENT

I. Cardinal d'un ensemble :

1) Définition du cardinal d'un ensemble fini :

Soit A un ensemble fini.

Le cardinal de A, noté Card (A) est le nombre d'éléments de l'ensemble A.

Exemple : $A = \{ 1 ; 2 ; 6 ; 9 ; 11 \}$ donc $\text{Card}(A) = 5$

2) Vocabulaire :

La réunion de deux ensembles A et B est l'ensemble de tous les éléments qui sont dans A ou dans B.

On la note $A \cup B$.

L'intersection de deux ensembles A et B est l'ensemble de tous les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. On la note $A \cap B$.

Deux ensembles sont dits disjoints si leur intersection est vide. A et B disjoints $\Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$

Exemple : $A = \{ 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 \}$ $B = \{ 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 \}$ $C = \{ 20 ; 30 \}$

3) Propriété admise :

Soit n un entier supérieur ou égal à 2 et A_1, A_2, \dots, A_n des ensembles finis deux à deux disjoints.

Alors : $\text{Card}(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \text{Card}(A_1) + \text{Card}(A_2) + \dots + \text{Card}(A_n) = \sum_{k=1}^n \text{Card}(A_k)$

4) Produit cartésien de deux ensembles :

Soit A et B deux ensembles non vides.

Le **produit cartésien** de A et de B, noté $A \times B$ (se lit « A croix B »), est l'ensemble constitué des couples $(x; y)$ où x est un élément de A et y un élément de B.

$$A \times B = \{(x; y), x \in A, y \in B\}$$

Exemple :

$$A = \{1 ; 2\} \quad \text{et} \quad B = \{3 ; 4\} \quad \text{on a : } A \times B = \{(1; 3) ; (1; 4) ; (2; 3) ; (2; 4)\}$$

ATTENTION ! Dans un couple, l'ordre est important !

$(1 ; 2)$ n'est pas le même élément que $(2 ; 1)$.

Propriété :

Soit A et B deux ensembles finis. Alors : $\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \times \text{Card}(B)$

Démonstration : (ex 68 p 47)

Définition :

Soit A un ensemble et n un entier naturel non nul.

On appelle **n -uplet de A** un élément de $A^n = A \times A \times \dots \times A$, (A est n fois)

Propriété :

Soit A un ensemble fini et n un entier naturel non nul. Alors $\text{Card}(A^n) = (\text{Card}(A))^n$

Démonstration : Démonstration par récurrence ex 69 p 47.

Application :

Un immeuble est protégé par un digicode. Ce code est formé de 4,5 ou 6 chiffres de 0 à 9 et d'une lettre parmi les 3 lettres A, B ou C. Combien de codes peut-on former avec ce système ?

Réponse :

II. Arrangements et permutations :

1) Définition d'une factorielle :

Soit n un entier naturel non nul.

On appelle **factorielle de n** le nombre : $n! = n \times (n - 1) \times \dots \times 2 \times 1$

Par convention, $0! = 1$

Exemple : $5! =$

2) Définition d'un arrangement :

Soit A un ensemble fini non vide à n éléments et k un entier naturel inférieur ou égal à n .

Un arrangement de k éléments de A (ou k -arrangement de A) est un k -uplet d'éléments distincts de A .

Exemple :

Si $A = \{1; 2; 3; 4\}$ alors $(1; 3; 4)$ et $(1; 4; 3)$ sont deux 3-arrangements de A .

et $(1; 4; 4)$ est un 3-uplet de A mais pas un 3-arrangement de A .

3) Propriété :

Soit A un ensemble fini non vide à n éléments et k un entier naturel inférieur ou égal à n .

Le nombre de k -arrangements de A est égal à : $A_n^k = n \times (n - 1) \dots \times (n - k + 1) = \frac{n!}{(n-k)!}$

Démonstration :

4) Définition d'une permutation :

Soit A un ensemble fini non vide à n éléments.

Une permutation de A est un n -uplet d'éléments distincts de A .

Une permutation de A est en fait un n -arrangement de A .

Le nombre de permutations d'un ensemble fini non vide à n éléments est $n!$

$$A_n^n = n \times (n - 1) \dots \times (n - n + 1) = n!$$

Exemple :

Si $A = \{1; 2; 3\}$ les permutations de A sont:

Application :

Dans une classe 5 élèves doivent passer un oral. De combien de façon peut on organiser ces oraux , chaque élève étant interrogé une seule fois ?

Combien y-a-t-il de possibilités si le professeur n'a le temps d'interroger que 3 d'entre eux ?

SolutionIII. Combinaisons d'un ensemble fini :1) Définition:

Une **partie** d'un ensemble A est un sous ensemble de A.

Tous les éléments d'une partie de A sont des éléments distincts de A.

Exemple

Si $A = \{1; 2; 3\}$ alors $\{1; 3\}$; $\{3\}$; $\{2; 3\}$ et \emptyset sont des parties de A.

2) Propriété:

Soit A un ensemble fini à n éléments. Le **nombre de parties de A est égal à 2^n** .

Démonstration :3) Définition d'une combinaison:

Soit A un ensemble fini à n éléments et k un entier naturel inférieur ou égal à n .

Une **combinaison** de k éléments de A est une partie de A de cardinal k .

Le nombre de combinaisons de k éléments parmi n est noté $\binom{n}{k}$. Il se lit " k parmi n ".

C'est un coefficient binomial.

4) Propriétés des coefficients binomiaux:

Soit n et k deux entiers naturels tel que $k \leq n$. Alors :

$$1) \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!} \quad \text{et} \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$2) \text{ Relation de Pascal : Si } 1 \leq k \leq n-1, \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

$$3) \text{ De plus } \binom{n}{0} = 1. \quad \text{Si } n \geq 1, \binom{n}{1} = n \quad \text{et} \quad \text{si } n \geq 2, \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Démonstrations : ex 94 p 50 et ex 105 p 51

1) Démonstration du 1) partie 1

Démonstration du 1) partie 2

3) Démonstrations :

5) Application : Le triangle de Pascal

n \ k	0	1	2	3	4	5	6	7
0	1							
1	1	1						
2	1	2	1					
3	1	3	3	1				
4	1	4	6	4	1			
5	1	5	10	10	5	1		
6	1	6	15	20	15	6	1	
7	1	7	21	35	35	21	7	1

Remarque : Formule du binôme de Newton

Pour tous réels a et b , et pour tout entier naturel $n \geq 1$, $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

Propriété :

Soit n un entier naturel. Alors $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$

Démonstration :

Soit A un ensemble fini à n éléments.

Pour tout entier naturel k inférieur ou égal à n , on note A_k l'ensemble des parties de A composées de k éléments. On a ainsi $\text{Card}(A_k) = \binom{n}{k}$

Les A_k sont deux à deux disjoints et leur réunion forme l'ensemble des parties de A .

Ainsi $2^n = \text{Card}(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{k=0}^n \text{Card}(A_k) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$

(On pourrait aussi faire une démonstration par récurrence)

Application :

Dans une grille comportant des nombres de 0 à 9 et les lettres de A à F, il faut choisir 3 nombres et 2 lettres.

Combien de grilles différentes existe-t-il ?

Solution :

Pour les nombres, il existe $\binom{10}{3} = \frac{10!}{(10-3)!3!} = 120$ combinaisons possibles.

Pour les lettres, il existe $\binom{6}{2} = \frac{6!}{(6-2)!2!} = 15$ combinaisons possibles.

Au total, il y a donc $120 \times 15 = 1800$ grilles possibles.